

모든 CRRT 환자들에게 사용할 수 있는 쉽고, 안전한 Baxter의 Premium Solution으로 시작해 주십시오!

PRISMASOL 2-4

CRRT를 진행하는 동안
사용되는 칼륨이 포함된
중탄산 완충 투석
/대체용액입니다



HEMOSOL

CRRT를 진행하는 동안
사용되는 전해질
중탄산 완충 투석
/대체용액입니다



PHOXILIUM

CRRT를 진행하는 동안
사용되는 인이 포함된
유일한 투석
/대체용액입니다



언제 **Prismasol**과 **Phoxilium**® 을 적용하면 되는가?



칼륨수치가 5.0mEq/L
미만으로 떨어질 때



인수치가 2.0mg/dl
이하로 떨어질 때

Phoxilium과 함께
정맥주사용 인을
주입하지 않도록 한다.
(고인산혈증 초래)

01 | CRRT 초기단계

투석액

Prismasol 2

대체액

Prismasol 2

02 | CRRT 초기유지단계

칼륨 5.0Eq/L 미만
인 2.0mg/dl 미만

Prismasol 4
Phoxilium

Prismasol 2

03 | CRRT 유지단계

칼륨 3.5Eq/L 미만
인 1.0mg/dl 미만

Prismasol 4
Phoxilium

Prismasol 4
Phoxilium

Prismaflex, PrisMax 사용 가능 용액

단위:mmol/L

Components	Hemosol B0	Prismasol 2	Prismasol 4	Phoxilium	정상혈장
K ⁺	0	2	4	4	3.5-5.0
Phosphate	0	0	0	1.2	0.8-1.5
Na ⁺	140	140	140	140	135-145
Cl ⁻	109.5	111.5	113.5	115.9	100-108
Ca ²⁺	1.75	1.75	1.75	1.25	1.14-1.30
HCO ₃ ⁻	32	32	32	30	22-26
Lactate	3	3	3	0	
Mg ²⁺	0.5	0.5	0.5	0.6	0.45-0.6
Glucose	0	6.1	6.1	0	23.29-35.49
Osmolality (mOsm/L)	287	297	301	293	
Unit Price	13,159	14,663	14,663	14,665	

[제품별 유효성분 함유량 : 용액 5,000ml 당 / 재구성 후 기준]
Prismasol 2 : K⁺ 7.45g, Prismasol 4 : K⁺ 14.9g, Phoxilium : K⁺ 1.491g, Phosphate 1.068g